



DEOSAN

Mastocide

AG201

Preparat do dezynfekcji strzyków po udoju, na bazie chlorheksydyny

Opis

Deosan Mastocide to preparat na bazie chlorheksydyny, przeznaczony do dezynfekcji strzyków po udoju. Jest to produkt gotowy do użycia, przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego, tylko u zwierząt. Posiada właściwości bakteriobójcze.

Cechy

- Deosan Mastocide zawiera 0,5% chlorheksydyny, skutecznej substancji biobójczej.
- Deosan Mastocide uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN1656.
- Deosan Mastocide dzięki charakterystycznej, fioletowej barwie jest dobrze widoczny na mytych strzykach.
- Deosan Mastocide dokładnie przylega do powierzchni strzyków, nie spływa.
- Deosan Mastocide posiada kombinację specjalnych substancji zmiękczających, a także olejek eukaliptusowy.

Korzyści

- Szybkie i skuteczne działanie biobójcze.
- Zapewnia długotrwałą ochronę przeciw drobnoustrojom.
- Charakterystyczna barwa utrzymująca się na powierzchni strzyków po ich zanurzeniu, to wskazówka dla hodowcy czy proces dezynfekcji został prawidłowo wykonany.
- Dokładnie przylega do powierzchni strzyków, ograniczając ilość marnowanego preparatu.
- Wygładza i zmiękcza skórę strzyków, a zapach produktu odstrasza muchy.

Sposób użycia

Produkt gotowy do użycia, stosować w postaci nierozcieńczonej.

1. Przed rozpoczęciem doju, należy odpowiednio przygotować strzyki.
2. Bezpośrednio po udoju, strzyki zanurzyć całą powierzchnią w kubkach z preparatem Deosan Mastocide. Kubek w dwóch trzecich powinien być wypełniony preparatem. Jeśli to konieczne uzupełniać poziom preparatu w trakcie użytkowania. Produkt pozostawić na skórze przez 30 minut. Nie rozcieńczać preparatu!
3. Kubki należy chronić przed kontaminacją.
4. Po procesie udoju kubki należy opróżnić i umyć, a przed następnym napełnieniem preparatem dezynfekcyjnym umyć.

Zalecenia: Myć wymiona i strzyki przed dojem. Zużyte pojemniki, po opróżnieniu dokładnie wypłukać wodą i przeznaczyć do recyklingu. Unikać zrzutów produktu do środowiska.

Uwaga: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

**DEOSAN****Mastocide****AG201****Właściwości**

Postać: fioletowa ciecz

pH (koncentrat, w 20°C): 4,5

Gęstość (20°C): 1,01

Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT): 150 gO₂/kg

Zawartość azotu (N): <1 g/kg

Zawartość fosforu (P): brak

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz. Nie mieszać z żadnymi preparatami chemicznymi. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Kompatybilność produktu

Nie mieszać z innym preparatami do strzyków.

Atesty, pozwolenia, opinie

Preparat Deosan Mastocide uzyskał pozwolenie MZ nr 3729/09 na obrót produktem biobójczym.

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

Preparat Deosan Mastocide uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1656:2001 (działanie bakteriobójcze), stosowany w stężeniu 20% oraz w postaci czystej, w warunkach obciążenia 10 g/l mleka odtłuszczonego, w czasie 30 minut, temperaturze 30°C.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Podczas pracy z preparatem przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych.

- Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry.
- W przypadku wdychania par/aerozoli wyprowadzić na świeże powietrze. W razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.
- Zanieczyszczone oczy płukać oczy z podniesioną powieką przez kilka minut pod bieżącą wodą. W przypadku wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.
- W razie polania, odzież zanieczyszczoną preparatem zdjąć, a zanieczyszczoną skórę zmyć wodą. W razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.
- W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, pić duże ilości wody. W przypadku wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Dodatkowe informacje odnośnie zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy i środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Deosan Mastocide, postępowania z odpadem produktu i opróżnionym opakowaniem, znajdują się w karcie charakterystyki.